



Sacco salvafragranza da 3kg e 10 kg
PALLETTIZZAZIONE
3 kg: 30 vassoi da 4 sacchi = 360 kg
10 kg: 35 sacchi = 350 kg

Alta digeribilità

Doppia omogeneizzazione

Denti puliti e gengive sane

Calcio, Fosforo, Zinco e Selenio

Composizione: Cereali (riso min. 5%), Carni e derivati, Sottoprodotti di origine vegetale (seme di soia integrale min. 4%, seme di lino integrale min. 1%), Estratti di proteine vegetali, Oli e grassi, Pesci e sottoprodotti dei pesci (pesce min. 6%), Lieviti, Sostanze Minerali, Zuccheri.

Componenti analitici: Proteina grezza: 30,0%; Oli e Grassi grezzi: 14,00%; Fibra grezza: 2,4%; Ceneri grezze: 7,9%; Calcio: 1,40%; Fosforo: 1,10%; Sodio: 0,30%.

Additivi nutrizionali: E672 Vitamina A: 24.800 U.I./kg; E671 Vitamina D3: 1.280 U.I./kg; 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato): 128 mg/kg; E1 Ferro: 70 mg/kg; E2 Iodio: 1 mg/kg; E4 Rame: 15 mg/kg; E5 Manganese: 70 mg/kg; E6 Zinco: 120 mg/kg; E8 Selenio: 0,30 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

Additivi organolettici: Coloranti.

Razioni giornaliere consigliate: da suddividere in due pasti.

Età del cucciolo	Razione giornaliera in % sul peso del cucciolo
2 mesi	dal 2,0 al 3,0%
3 - 4 mesi	dal 2,5 al 3,5%
5 - 7 mesi	dal 2,5 al 3,2%
8 mesi - 1 anno	dal 2,0 al 3,0%

Crancy® Junior

Crancy Junior è un alimento completo e bilanciato per lo svezzamento dei cuccioli di qualsiasi razza, fino ad 1 anno di età.

È particolarmente consigliato in questi mesi critici della vita del tuo cucciolo nei quali qualsiasi squilibrio alimentare può provocare ritardi nello sviluppo degli organi del soggetto. Grazie ad un ottimo equilibrio tra livelli aminoacidici, energia metabolizzabile, lipidi saturi, mono e polinsaturi unito ad un corretto apporto vitaminico e minerale, Crancy Junior favorisce un'armoniosa crescita del tuo cucciolo. Adatto anche per l'alimentazione di cagne in allattamento.

Istruzioni per l'uso: Crancy Junior va somministrato a partire dalla 6°/8° settimana di vita del cucciolo. Iniziare con qualche crocchetta di Crancy Junior inumidita con un po' di latte o acqua tiepidi. Fino a sei mesi è opportuno dividere la razione in almeno 3 pasti quotidiani (mattino, pomeriggio e sera). Dal 6° mese in poi i pasti possono essere ridotti a due (mattina e sera). È importante tenere sempre a disposizione dei soggetti acqua non fredda. Dopo il quarto mese di vita non somministrare latte vaccino. Non cambiare spesso tipo di alimentazione (secco-umido-casalengo) per non alterare continuamente la flora intestinale del tuo cucciolo. Seguire sempre le profilassi di vaccinazioni consigliate dal tuo veterinario.

